

Augentropfen richtig anwenden

1.

- ⊗ Vor der Anwendung die Hände waschen, damit weder Schmutz noch Keime ins Auge gelangen.
- ⊗ Eventuell an den Augenlidern haftende Salben- oder Sekretreste vorsichtig mit sauberem und trockenem Tuch entfernen.



2.

- ⊗ Beide Augen weit öffnen und Kopf in den Nacken neigen.
- ⊗ Den Blick nach oben auf einen festen Punkt richten, um ein reflexartiges Blinzeln zu unterdrücken.
- ⊗ Mit dem Zeigefinger der freien Hand das Unterlid am Wimpernansatz leicht nach unten schieben, damit sich eine Tasche (Bindehautsack) bildet.



3.

- ⊗ Das Fläschchen möglichst senkrecht und dicht über dem geöffneten Bindehautsack positionieren.
- ⊗ Durch leichtes Drücken auf das Fläschchen einen einzigen Tropfen freisetzen und in den Bindehautsack fallen lassen.
- ⊗ Direkten Kontakt der sterilen Tropfspitze mit Auge, Wange oder Fingern vermeiden.



4.

- ⊗ Das Unterlid loslassen und die Augen mindestens 1 Minute schließen (nicht zukneifen). Leicht mit den Augäpfeln rollen.
- ⊗ Gegebenenfalls zusätzlich mit der Fingerspitze leicht auf den Nasenknochen am Augeninnenwinkel drücken, um den Tränenkanal zu schließen.
- ⊗ Nach der Anwendung Tropfenflasche wieder fest verschließen.



Weitere Tipps siehe Rückseite



Dorzolamid/Timolol Micro Labs

20 mg/ml + 5 mg/ml ATR

Ketorolac Micro Labs 5 mg/ml ATR



Augentropfen richtig anwenden

Eine sorgfältige Anwendung von Augentropfen ist beim ersten Mal vielleicht etwas knifflig – sie ist allerdings sehr wichtig, damit das Medikament seine Wirkung voll entfalten kann und unerwünschte Wirkungen vermieden werden.

Allgemeine Tipps für die Anwendung von Augentropfen

- ⊕ Einfach ausprobieren, ob das Tropfen im Stehen, Sitzen oder Liegen leichter fällt.
- ⊕ Kalte Flüssigkeiten reizen das Auge. Deshalb Augentropfen vor Anwendung einige Minuten in der Hand oder Hosentasche auf Körpertemperatur erwärmen.
- ⊕ Je nach Produkt Kontaktlinsen vor der Anwendung entfernen und frühestens 15 Minuten nach der Anwendung wieder einsetzen (Packungsbeilage beachten).
- ⊕ Müssen verschiedene Augentropfen angewendet werden, sollten die Tropfen mit einem Abstand von etwa 10 Minuten geträufelt werden (Packungsbeilage beachten).
- ⊕ Jeder Patient verwendet ausschließlich sein eigenes Behältnis, um eine Keimübertragung zu vermeiden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Bitte beachten Sie die Packungsbeilage Ihres Arzneimittels und auch seine begrenzte Haltbarkeit.



Micro Labs GmbH

Lyoner Str. 14
60528 Frankfurt

Tel.: 069-66554451

Fax: 069-66554351

info@microlabsgmbh.de

www.microlabsgmbh.de